



Torna la ràbia després de 35 anys, i gossos, gats i fures de diverses comarques catalanes s'hauran de vacunar

Redacció Actualitzat a les **12:19 h 13/06/2013**

Els gossos, gats i fures de Banyoles i Porqueres, al Pla de l'Estany; Piera, a l'Anoia, i Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, **s'han de vacunar contra la ràbia**. En aquestes poblacions hi va estar un **pitbull de Montcada** infectat de ràbia, de la qual s'hauria contagiats al Marroc, i que **a Toledo va atacar quatre nens i un adult**. Es tracta del **primer cas registrat a l'Estat des del 1978**. La Generalitat **ha confinat tretze gossos** que van tenir contacte amb l'animal i els vacunarà en un termini de quinze dies. La protectora de **Mataró** també vacunarà els seus animals.

A Castella-la Manxa s'han establert dues zones de restricció: uns 20 quilòmetres al voltant de Toledo i 20 més al voltant d'Argés, així com en alguns municipis d'Aranjuez i Monzón.

Després d'haver-se detectat el primer cas de ràbia a l'Estat en 35 anys, el Ministeri de Sanitat ha declarat el **nivell d'alerta 1** durant els propers sis mesos d'acord amb el Pla de Contingència per al Control de la Ràbia als Animals Domèstics. Amb tot, alerta que el risc d'infecció és "molt baix" i que només es donen casos, molt excepcionals, en animals de Ceuta i Melilla procedents del Marroc i d'altres països del nord d'Àfrica, malgrat que la vacuna és obligatòria i gratuïta. Tot i això, Sanitat admet que "no es pot descartar que apareguin altres animals amb ràbia en les àrees de restricció" establertes i recorda que **la transmissió de la malaltia entre humans es pot donar**, però que el risc és molt baix.

La ràbia és una malaltia provocada pel virus de la família Rhabdoviridae, que afecta animals domèstics i salvatges. **Els gossos en són els principals transmissors**, però també la transmeten altres animals com ratpenats, gats o fures.

Per prevenir el contagi, Sanitat recomana evitar el contacte amb animals desconeguts. Ara bé, **en cas de ser infectat** per un animal, el primer que cal fer, i com més aviat millor, és netejar molt bé la ferida amb aigua i sabó durant uns 5 minuts i si és possible aplicar-hi desinfectant. Però, davant de qualsevol risc, cal anar a un centre sanitari per fer-se les proves i posar-se la vacuna.

Informació extreta de:

<http://www.324.cat/noticia/2136935/societat/Torna-la-rabia-despres-de-35-anys-i-gossos-gats-i-fures-de-diverases-comarques-catalanes-shauran-de-vacunar>

Comunicació Real CEPPA Catalunya